

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Madécassol 1% Αλοιφή

Centella asiatica

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στο φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Madécassol και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Madécassol
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Madécassol
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Madécassol
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Madécassol και ποια είναι η χρήση του

Τι είναι το Madécassol

Το Madécassol είναι φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα φυτικής προέλευσης. Η δραστική ουσία που περιέχει, η οποία είναι τιτλοποιημένο εκχύλισμα *Centella Asiatica*, ενός φυτού που ευδοκιμεί κυρίως στη νήσο Μαγαδασκάρη, έχει την ικανότητα να διεγείρει τη βιοσύνθεση του κολλαγόνου μέσα από τους ινοβλάστες του δέρματος και, ως εκ τούτου, τείνει να βοηθά στο μηχανισμό της επούλωσης.

Ποια είναι η χρήση του Madécassol

Πιθανώς αποτελεσματικό ως επουλωτικό τραυμάτων.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Madécassol

Μη χρησιμοποιήσετε το Madécassol

- σε περίπτωση αλλεργίας στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- σε ανοιχτές πληγές που έχουν τάση έντονης εφίδρωσης.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, πριν χρησιμοποιήσετε το Madécassol. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κοντά στους οφθαλμούς, διότι δεν είναι κατάλληλο για οφθαλμική χρήση.

Εάν κατά τη χρήση παρουσιαστούν αλλεργικές αντιδράσεις, φαινόμενο πολύ σπάνιο, πρέπει να γίνει διακοπή της χρήσης του φαρμάκου.

Άλλα φάρμακα και Madécassol

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και ουσίες.

Κύηση και θηλασμός

Κύηση

Δε συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Θηλασμός

Δε συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Madécassol δεν επηρεάζει την ικανότητα της οδήγησης και του χειρισμού μηχανημάτων.

Η αλοιφή Madécassol περιέχει propylene glycol το οποίο μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό.

3. Πώς να χρησιμοποιείτε το Madécassol

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Πριν από την τοπική εφαρμογή του Madécassol, πρέπει να γίνεται προσεκτικός καθαρισμός και απολύμανση του τραύματος. Η αλοιφή Madécassol εφαρμόζεται με απαλή εντριβή και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που το δέρμα είναι ξηρό ή υπάρχουν εφελκίδες, για την επάλειψη των τραυμάτων πριν και μετά από ραδιοθεραπείες ή για μασάζ σε χηλοειδή. Χρησιμοποιείται κάθε φορά που γίνεται αλλαγή τραύματος, συνήθως μία ή δύο φορές την ημέρα με τρόπο που εξασφαλίζει ικανή τοπική χρήση - επικάλυψη του τραύματος.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Madécassol από την κανονική

Περίπτωση υπέρβασης της δοσολογίας και δηλητηρίασεως από τις μορφές τοπικής χρήσης πρακτικώς δεν υφίσταται.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Madécassol

Για την περιοχή του δέρματος επί της οποίας εφαρμόζεται η αλοιφή Madécassol ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης, χρησιμοποιώντας το προϊόν κατά την επόμενη αλλαγή του τραύματος. **Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.**

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Η τοπική εφαρμογή της αλοιφής Madécassol μπορεί προκαλέσει αίσθημα καύσου και σπανιότατα, συμπτώματα υπερευαισθησίας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Madécassol

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στο σωληνάριο μετά τη ΛΗΞΗ/EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. Το σωληνάριο πρέπει να κλείνεται καλά μετά από κάθε χρήση.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Madécassol

Η δραστική ουσία είναι ξηρό εκχύλισμα *Centella asiatica* τιτλοποιημένο ως προς 40% ασιατικόσίδη (asiaticoside) και 60% σε μαδεκασικό και ασιατικά οξέα (madecassic και asiatic acids).

Κάθε 1g της αλοιφής Madécassol περιέχει 10mg ξηρού εκχυλίσματος *Centella asiatica*.

Τα άλλα συστατικά είναι: Ethylene glycol monostearate, Propylene glycol, Thick liquid paraffin, Terpene free geranium oil, Terpene free lavender oil, Water purified.

Εμφάνιση του Madécassol και περιεχόμενο της συσκευασίας

Χάρτινο κουτί που περιέχει λευκή αλοιφή εντός αλουμινένιου σωληναρίου 10g ή 40g, που φέρει πλαστικό πώμα. Το πώμα, εάν τοποθετηθεί ανάποδα επί του στομίου του αρχικά κλειστού σωληναρίου, χρησιμεύει και για το αρχικό άνοιγμα.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λεωφ. Γαλατσίου 115, 111 46 Γαλάτσι, Τηλ.: 210-292.3451-2
Fax: 210- 292.2581

Παρασκευαστής

HELP A.B.E.E., Βαλαωρίτου 10, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ: 210 281 5353

Δικαιούχος σήματος

BAYER CONSUMER CARE AG

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Τρόπος διάθεσης

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.